

## 6. Öffentlich empfohlene Schutzimpfungen

### 6.1 Allgemein, ohne besonderen Anlass empfohlene Impfungen (Standardimpfungen, Regelimpfungen)

#### Synopsis-Impfkalender für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Freistaat Sachsen

Stand: 01.01.2012

Impfstoff	Geburt	7. Woche <sup>1</sup>	3. Mon. <sup>1</sup>	4. Mon. <sup>1</sup>	5. Mon. <sup>1</sup>	6. Mon. <sup>1</sup>	13. Mon. <sup>1</sup>	24. Mon. <sup>1</sup>	6. Lbj. <sup>1</sup>	11. Lbj. <sup>1</sup>	13. Lbj. <sup>1</sup>	18. Lbj. <sup>1</sup>	26. Lbj. <sup>1</sup>	alle 10 Jahre	über 50 Jahre	über 60 Jahre
Hepatitis B <sup>3,6</sup> und Hepatitis A <sup>6</sup> (HBV/HAV)	HBV 1 / HBV 2 <sup>3</sup>						HBV 3/4 <sup>3</sup> od. HAV/HBV <sup>6</sup>			HAV/HBV <sup>6</sup>						
Diphtherie, Tetanus, Pertussis <sup>2,3,4</sup>		1. DTPa	2. DTPa	3. DTPa			4. DTPa		5. DTPa oder Tdpa <sup>4</sup>	Tdpa				Tdpa		
Haemophilus influenzae Typ b <sup>2,3</sup>		1. Hib	3	2. Hib			3. Hib									
Polio (IPV) <sup>2,3</sup> (trivalent)		1. IPV	3	2. IPV			3. IPV			4. IPV				IPV		
Masern, Mumps, Röteln (MMR)							1. MMR		2. MMR							
Varizellen (VZV) <sup>5</sup>							1. VZV		2. VZV							
Meningokokken C <sup>7</sup>		Meningokokken (Gruppe C)														
Influenza <sup>8</sup>							jährlich <sup>8</sup>									
Pneumokokken		Pneumokokken <sup>9</sup>														Pneumokokken
Rotaviren <sup>10</sup>		Rotaviren														
Humane Papillomaviren (HPV) <sup>11</sup>											HPV					
Herpes zoster																Herpes zoster

<sup>1</sup> Zeitangabendefinition: Es bedeuten z.B.: 3. Mon. = ab 3. Monat = vollendeter 2. Monat; 7. Woche = ab 7. Woche = vollendete 6. Woche; 6. Lbj. = ab 5. Geburtstag

<sup>2</sup> Abstände zwischen den Impfungen 1-3 bzw. 1 und 2 mindestens 4 Wochen, zwischen der 3. und 4. bzw. 2. und 3. Impfung zur Vervollständigung der Grundimmunisierung mindestens 6 Monate

<sup>3</sup> bei Antigenkombinationen, die eine Pertussiskomponente enthalten, sind 3 Injektionen im Säuglingsalter erforderlich

<sup>4</sup> ab 6. Lbj. Fachinformation zu den Impfstoffen wegen Altersbegrenzung hinsichtlich reduzierten Di-Toxoid-Gehalts beachten

<sup>5</sup> alle ungeimpften Kinder/Jugendlichen mit negativer Varizellenanamnese und alle empfänglichen Erwachsenen als Nachholeimpfung

<sup>6</sup> ab 2. Lbj. Kombinationsimpfung HAV/HBV empfohlen, falls Grundimmunisierung gegen HBV nicht im Säuglingsalter begonnen wurde; wenn ja, dann Hepatitis A monovalent impfen.

<sup>7</sup> Im 1. Lbj. 2 Injektionen (Herstellerangaben beachten), ab 2. Lbj. 1 Injektion. Bei Impfung im Säuglingsalter wird eine Boosterung ab 2. Lebensjahr empfohlen.

<sup>8</sup> ab vollendetem 6. Lebensmonat

<sup>9</sup> Die Standardimpfung wird bis zum 24. Lebensmonat entsprechend dem jeweiligen Immunisierungsschema mit Konjugatimpfstoff empfohlen, bei Kindern nach dem 24. Lebensmonat sind nur Indikationsimpfungen empfohlen.

<sup>10</sup> orale Impfung mit 2 oder 3 Dosen (Herstellerangaben beachten), Simultanimpfung siehe E 1, Seite 8 und 12 (Fußnote \*\*\*\*\*)

<sup>11</sup> alle Mädchen und Frauen