VOM SUCHEN UND FINDEN ANÄMIEDIAGNOSTIK MIT BIOMARKERN

Zellulären Biomarker im Patient Blood Management
(RET-HE, Delta – He, Etc.)
Strategien und Erfahrungen

**St. Marienhospital
Vechta**

Webinar QBH Treffen Dresden, 23.09.2025, 15:00 - 15:30 Uhr

Prof. Dr. med. Christian Hönemann

**Chefarzt
Abteilung für Anästhesie und operative Intensivmedizin
Marienhospital Vechta gGmbH
Marienstraße 6-8
49377 Vechta
Email: christian.hoenemann@kh-vec.de**

ACHTUNG COMPLIANCE -

Marienhospital Vechta gGmbH
Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin
9800 Operationen
2000 Geburten
2000 Intensivpatienten
Onkologischer Schwerpunkt
(Pankreas / Colon / Rektum / Gynäkologie / HNO)

Honorare für Vorträge, Reise und Hotelkosten,
Beratung und wissenschaftliche Studien, usw.

Systemex GmbH - Anämiediagnostik
CSL_Vifor GmbH – patient blood management
Dräger Medical GmbH&CoKg – green anaesthesia
Sedana Medical GmbH – inhalational sedation

DGAI, WIVIM, BDA, IARS, ESA, ASPA, IAKH
Hartmannbund, Ärztekammer Niedersachsen

VERBESSERTER DIAGNOSE VON EISENMANGELANÄMIE BEI KRITISCH KRANKEN DURCH FLUORESCENZ- DURCHFLOSSZYTOMETRISCHE HÄMOGLOBIN-BIOMARKER

Eine prospektive Beobachtungsstudie, Promotion 2025, magna cum laude (schriftlich 1,2, mündlich 1,1)

Dr. med. Mascha Zuther,
Clemenshospital der Alexianer,
Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin,
Chefarzt: Prof. Dr. med. Manuel Wenk

Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie, UKM

PRAKTISCHE UMSETZUNG VON RET-HE (RETIKULOZYTEN-HÄMOGLOBIN-ÄQUIVALENT) IM PATIENT BLOOD MANAGEMENT (PBM):

STRATEGIEN UND ERFAHRUNGEN

REFERENT*INNEN: C. HÖNEMANN, VECHTA

INHALTSVERZEICHNIS

1. PRÄOPERATIV

2. DIAGNOSTIK

3. POSTOPERATIV

II. PATIENT BLOOD MANAGEMENT (PBM)

präoperativ

UNSER FALL (PRÄOPERATIV)

HERR J.B., 53 JAHRE, 186 CM, 88 KG

Einweisungsdiagnose:

Bilobulär, multifokal hepatisch metastasiertes, stenosierendes Adenokarzinom des Colon sigmoideum (Histologie: pT4a, pN1b, pM1a (HEP) L1 V0 Pn1)

Hypertensive Herzerkrankung, benigne Prostatahypertrophie, Gastroösophageale Refluxerkrankung

Laborwerte bei Aufnahme:

Hb 8,1 g / dl, HK 28%, MCV 70,1 fl, MCH 20,1 pg, RetHe 24,5, Reti 1,5%, RPI 3

Hst 24 mg/dl, Krea 0,94 mg/dl

CRP 2,4 mg/l, PCT 0,09

Laktat 12 mg/dl

ANÄMIE PRÄOPERATIV

WAS IST DIE MÖGLICHE URSACHEN

Gesteigerter Abbau

- Z.B. Autoimmunhämolytische Anämie
- Membrandefekte
- Herzklappen
- Malaria

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß [CC BY-SA](#)

Blutverlust

- **Akut** (z.B. OP; Unfälle)
- **Chronisch** (z.B. Gastrointest. Erkrankungen, Tumor Erkrankungen)

Beeinträchtigte Erythropoese

- **Mineralstoffmangel**
(z.B. Vit. B 12 Mangel, Folsäuremangel Eisenmangel)
- **Toxisch** (z.B. Medikamente, Alkoholabusus)
- **Hereditär** (z.B. PNH, EPP)
- **Verdrängung** (z.B. maligne KM-Erkrankungen)

WAS IST PERIOPERATIVES PATIENT BLOOD MANAGEMENT?

PBM IST EIN INTERDISZIPLINÄRER UND MULTIMODALER UND SEKTORENÜBERGREIFENDER ANSATZ

PBM BEZIEHT IN DER PRÄ-, INTRA- UND POSTOPERATIVEN PHASE VERSCHIEDENE BEREICHE UND MEDIZINISCHE DISZIPLINEN EIN

PRÄOPERATIVE ANÄMIE: LEITLINIEN DER NATA BEI ELEKTIVEN ORTHOPÄDISCHEN EINGRIFFEN

ALGORITHMUS ZU NACHWEIS, BEWERTUNG UND MANAGEMENT EINER PRÄOPERATIVEN ANÄMIE¹

Mod. nach Goodnough LT et al. 2011.

1. Goodnough LT et al. Brit J Anaesth 2011; 106 (1): 13–22.

HERAUSFORDERUNG PRÄOPERATIV

Akute Phase Reaktionen

Auslöser: (chron.) inflammatorische/maligne Erkrankungen, Systemerkrankungen, Infektionen etc.

Hauptsächliche Effektoren: Immunmodulatoren (IL-1/IL-6/IL-10/TNF- α / IFN- γ) und Hepcidinsynthese

Retention des Eisens in das retikulohistiozytäre System (Dysregulation)

später **Anämie chronischer Erkrankungen (ACD)** – Hospital Acquired Anemia

→ Einschränkung der Hämoglobinsynthese der Retikulozyten

Pathogenese der ACD

DIAGNOSTIK EISENSTOFFWECHSEL

Konzentration freies Eisen

Fluktuierend: Nahrungsaufnahme, zirkadiane Rhythmen
erniedrigt: Infektionen

Serum-Eisen

Serum-Ferritin

Speicherung von Eisen im RES

erniedrigt: Eisen-, Transferrinmangel, Hypothyreose
erhöht: Verwertungs-/Verteilungsstörung, Infekt, Lebererkrankungen, Ca, Bluttransfusion

Transportprotein des Eisens

erhöht: Eisenmangel
erniedrigt: Entzündungsreaktion

Sättigung des Transferrins mit Eisen

erhöht: Hämochromatosen
erniedrigt: Eisenmangel, Verteilungsstörung

Eisenbedarf der Erythropoese

erhöht: Eisenbedarf
normal: chronische Erkrankungen
erniedrigt: Entzündungsreaktion

Transferrin

Transferrin-sättigung

Löslicher Transferrin-Rezeptor

AKTUELLE LEITLINIENEMPFEHLUNGEN: DIAGNOSTIK

Modifizierter Leitfaden zur Anämiediagnostik:
 DGAI, AWMF. S3 Leitlinie: Präoperative Anämie Diagnostik und Therapie der
 Präoperativen Anämie, Leitlinie (Langversion). AWMF online; 2018

Parameter

Veränderung in Akut Phase Reaktion

Serumferritin
 [30-400 ng/ml]

↑↑

Transferrin
 [200-400 mg/dl]

normal bis ↓

Transferrinsättigung (TSAT)
 [16-45 %]

↓↓

löslicher Transferrinrezeptor (sTfR)
 [0,9-2,8 mg/l]

normal

sTfR/log Ferritin
 [methoden-abhängig]

normal

Hepcidin
 [methoden-abhängig]

↑↑

PARAMETER DER RETIKULOZYTENHÄMOGLOBINISIERUNG

I. RET-He [29,3 - 35,4 pg] [8]

- Hämoglobinisierungsgrad der Retikulozyten
- Surrogatparameter für zur Erythropoese zur Verfügung stehendes Eisen ($\neq$ Eisenspeicherfüllung)

II. Delta-He [1,2 - 3,6 pg] [8]

- rechnerische Differenz des Hämoglobinisierungsgrades der Retikulozyten vs. Erythrozyten

Messverfahren: Fluoreszenz-Durchflusssyztometrie
© all rights reserved, mit freundlicher Genehmigung der Fa. SYSMEX

Review

> J Clin Med. 2021 Sep 19;10(18):4250. doi: 10.3390/jcm10184250.

Reticulocyte and Erythrocyte Hemoglobin Parameters for Iron Deficiency and Anemia Diagnostics in Patient Blood Management. A Narrative Review

Christian Hoenemann ¹, Norbert Ostendorf ², Alexander Zarbock ³, Dietrich Doll ¹,
Olaf Hagemann ¹, Mathias Zimmermann ⁴, Markus Luedi ⁵

Affiliations + expand

PMID: 34575361 PMCID: [PMC8470754](#) DOI: [10.3390/jcm10184250](#)

Free PMC article

EISENMANGELANÄMIE (IDA)

	AUC (IDA):
Ferritin	0,920
RET-He	0,892
TSAT	0,791
Delta-He	0,752
Serumeisen	0,737
Signifikante Unterschiede:	
RET-He/Delta-He	$p < 0,001$
RET-He/TSAT	$p = 0,046$
RET-He/Serumeisen	$p = 0,01$
Ferritin/ Delta-He	$p = 0,002$
Ferritin/TSAT	$p = 0,018$
Ferritin/Serumeisen	$p = 0,001$
TSAT/Serumeisen	$p < 0,001$

IDA:

- n = 25
- 45 auswertbare Labordaten

FUNKTIONELLE EISENMANGELANÄMIE (FID)

	AUC (FID):
RET-He	0,847
Serumeisen	0,835
Delta-He	0,808
TSAT	0,754
Ferritin	0,678

Signifikante Unterschiede:	
RET-He/Ferritin	$p < 0,001$
RET-He/TSAT	$p = 0,009$
Delta-He/Ferritin	$p < 0,001$
Ferritin/Serumeisen	$p < 0,001$
TSAT/Serumeisen	$p < 0,001$

FID:

- n=60
- 134 auswertbare Labordaten

ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE

- **RET-He & DELTA-He** sind gut geeignete Parameter für die Diagnose eines **absoluten** oder **funktionellen Eisenmangels**
 - trotz signifikant erhöhter Inflammationsmarker
- im Vergleich mit den serologischen Parametern: **Überlegenheit** v.a. bei der Diagnose einer FID (ggü. Ferritin/TSAT)
 - **direkte Abbildung einer behandlungsbedürftigen Konsequenz eines Eisenmangels**

UNSER FALL (PRÄOPERATIV)

HERR J.B., 53 JAHRE, 186 CM, 88 KG

Einweisungsdiagnose:

Bilobulär, multifokal hepatisch metastasiertes, stenosierendes Adenokarzinom des Colon sigmoideum (Histologie: pT4a, pN1b, pM1a (HEP) L1 V0 Pn1)

Hypertensive Herzerkrankung, benigne Prostatahypertrophie, Gastroösophageale Refluxerkrankung

Laborwerte bei Aufnahme:

Hb 8,1 g / dl, HK 28%, MCV 70,1 fl, MCH 20,1 pg, RetHe 24,5, Reti 1,5%, RPI 3

Hst 24 mg/dl, Krea 0,94 mg/dl

CRP 2,4 mg/l, PCT 0,09

Laktat 12 mg/dl

PRÄOPERATIVE ANÄMIE: BEURTEILUNG UND THERAPIE

***RPI - Retikulozyten Reproduktions-Index**

Bei Gesunden: RPI: 1-2

RPI bei Anämie:

> 2 → effektive Regeneration

> 3 → hyperregenerativer Erythropoese

< 2 → hypoplastische / ineffektiver Erythropoese

Restriktive Indikation zur Transfusion auf der ICU

► **Tab. 4** Querschnitts-Leitlinie der Bundesärztekammer [29] (modifiziert)

Hb-Wert	Transfusion	Bemerkung
≤ 6 g/dl (≤ 3,7 mmol/l)	ja	Im Einzelfall können bei adäquater Kompensation und ohne Risikofaktoren auch niedrigere Hb-Werte ohne Transfusion toleriert werden.
> 6–8 g/dl (3,7–5 mmol/l)	ja	bei eingeschränkter Kompensation und vorhandenen Risikofaktoren, z. B. <ul style="list-style-type: none"> ▪ koronare Herzkrankheit ▪ Herzinsuffizienz ▪ zerebrovaskuläre Erkrankungen Hinweise auf anämische Hypoxie (= physiologische Transfusionstrigger): z. B. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tachykardie ▪ Hypotension ▪ ischämietypische EKG-Veränderungen (ST-Streckenveränderungen) ▪ Laktatazidose (Laktat > 2 mmol/l + Azidose) ▪ Anstieg der globalen O₂-Extraktion > 50% ▪ Abfall der gemischtvenösen O₂-Sättigung < 50% ▪ Abfall der zentralvenösen O₂-Sättigung < 60% ▪ neu auftretende Rhythmusstörungen oder regionale myokardiale Kontraktionsstörungen
	nein	bei adäquater Kompensation und nicht vorhandenen Risikofaktoren
8–10 g/dl (5–6,2 mmol/l)	ja/nein	ABER: sehr schwache Empfehlung mit unklarem Nutzen-Risiko-Verhältnis Hinweise auf anämische Hypoxie (physiologische Transfusionstrigger)
> 10 g/dl (≥ 6,2 mmol/l)	nein	Im Einzelfall kann eine Transfusion auf Hb-Werte > 10 g/dl indiziert sein.

WELCHES EISEN, ORAL/I.V.? EISENRESORPTION ORALER FE(II) PRÄPARATE

Präparat	Resorptionsrate ohne Inflammation
Fe (II), quick release	
Assofer	7,6 %
Eryfer	7,7 %
Spartocine	7,0 %
Fe (II), slow release	
Ferro sanol duodenal	6,6 %
Kendural C	4,5 %
Tardyferon	3,4 %
Fe (II)-Brausetabletten	
Lösferron	3,1 %

Inflammation

 signifikant reduzierte Resorptionsleistung des Darms

LEITLINIEN EMPFEHLUNGEN ZUR EISENSUBSTITUTION

EMPFEHLUNG INTERNATIONALER UND NATIONALER LEITLINIEN ZUR BEHANDLUNG MIT I.V. EISEN (III. Generation)

Internationale und nationale klinische Leitlinien empfehlen die **Behandlung der präoperativen Eisenmangelanämie mit i.v. Eisen** statt oralem Eisen, wenn der Abstand zwischen der Anämiediagnose und der Operation **weniger als 6 bis 8 Wochen** beträgt.^{1-3 *}

* Die Europäische Gesellschaft für Anästhesiologie empfiehlt unabhängig vom Zeitpunkt, intravenösem Eisen den Vorzug vor oralem Eisen zu geben (Empfehlungsgrad 1C).

i.v. Eisen ist indiziert zur Behandlung von Eisenmangelzuständen, wenn orale Eisenpräparate unwirksam sind, orale Eisenpräparate nicht angewendet werden können oder die medizinische Notwendigkeit einer raschen Eisengabe besteht. Die Diagnose eines Eisenmangels muss durch geeignete Laboruntersuchungen bestätigt sein.⁵

1. European Board of Anaesthesiology (EBA UEMS) UEMS Anaesthesiology Section and Board. European Patient Safety Recommendations. Recommendations for preoperative anaemia and patient blood management 2016. 2. Muñoz M et al. Anaesthesia. 2017; 72(2): 233–47 [Internationale Konsenserklärung zur perioperativen Behandlung von Anämie und Eisenmangel]. 3. National Blood Authority Australia. Patient Blood Management Guidelines Module 2. 2012. 4. Kozek-Langenecker SA et al. Eur J Anaesthesiol. 2017; 34: 332–95. 5. Fachinformation Ferinject, in der jeweils gültigen Fassung.

ALSO III. GENERATION I.V. EISEN EMPFOHLEN EIGENSCHAFTEN UNTERSCHIEDLICHER INTRAVENÖSER EISENFORMULIERUNGEN

	Eisengluconat	Eisensucrose	Eisendextran (niedermolekular)	Eisen- carboxymaltose
Molekulargewicht	< 50 kD	34-60 kD	165 kD	150 kD
Komplexstabilität	gering	mäßig	hoch	hoch
akute Toxizität	hoch	mittel	gering	gering
Maximaldosis	62,5 mg	500 mg	20 mg/kg KG	1.000 mg
minimale Infusionsdauer	30 min	210 min	360 min	15 min
maximale Einzeldosis bei Injektion	62,5 mg	200 mg	200 mg	1000 mg
maximale Injektionsdauer	10 min	10 min	2 min	Bolus
Testdosis erforderlich	nein	ja	ja	nein

Kosten + Nutzen

**ENDE DER MÄRCHENSTUNDE
ÜBER EISEN, ERYTHROPOETIN
UND PHOSPHATSPIEGEL**

REKOMBINANTES EPOETIN IST NICHT MIT TUMORWACHSTUM ASSOZIIERT

Präklinische Studien

Untersuchung der EPO-Rezeptor-Expression und Auswirkung einer Therapie mit rekombinanten Epoetinen auf das Tumorstadium

Ergebnisse

In Mammakarzinom-Zelllinien

- Es wurde eine EPO-Rezeptor-Expression nachgewiesen
- Es war keine spezifische Bindung von Epoetin an den Rezeptor zu beobachten, was darauf hinweist, dass der EPO-Rezeptor nicht funktionsfähig ist
- Eine Epoetin-Therapie führte nicht zu Tumorstadium
 - Epoetin löste keine physiologische Reaktion des Tumors aus (Proliferation, Migration, Signaltransduktion)

Eisen und seine Regulation in der Immunabwehr

Die Rolle des Eisens bei verschiedenen zellulären Funktionen der Immunabwehr. Eine Hauptstrategie der Immunabwehr ist die Hepcidin-vermittelte Drosselung der Eisenzufuhr aus der Nahrung und dem Hämoglobinabbau. Mit Bakterien infizierte Makrophagen können vermehrt den Eisenexporter Ferroportin bilden, um den Pathogenen das Eisen für ihre intrazelluläre Replikation zu entziehen.

Eisen ist erforderlich für eine kompetente Immunabwehr

Eisen fördert bakterielles und virales Wachstum

Blutkonserven enthalten ca. 250 mg Eisen

Die Rolle des Eisens bei Infektionen

Immunologie -- Autor: P. Nielsen

Die COVID-19-Pandemie hat die Diskussion um Infektiosität und Immunabwehr neu befeuert. Viele Studien haben sich damit beschäftigt, wie wichtig Eisen für die Infektabwehr ist. Eine grundlegende Abwehrstrategie des angeborenen Immunsystems ist, den Zugang zu Eisen aus dem Blut oder aus bestimmten Zellen für pathogene Keime stark zu begrenzen. Gleichzeitig brauchen aber die Zellen des Immunsystems selbst genügend Eisen für ihre Ausreifung und Funktion, sodass bei jeder Infektion ein Gleichgewicht zwischen Begrenzung und Angebot von Eisen wichtig ist.

Prof. Dr. med. Dr. rer. nat.
Peter Nielsen
Ehemaliger Leiter
Eisenstoffwechsel-
ambulanz
UKE, Hamburg

Die Fähigkeit von Eisen, in biologischen Systemen reversibel Elektronen abgeben zu können, macht es zu einem wichtigen Ko-Faktor bei Oxidations-Reduktions-Reaktionen und bildet die Grundlage für viele Stoffwechselfunktionen von fast allen Organismen. Eisenmangel mit oder ohne Anämie ist mit einer teilweisen Atrophie verschiedener lymphoider Organe und Veränderungen vieler molekularer und zellulärer Immunfunktionen verbunden [1]. Als Haupteffekte eines Eisenmangels gelten die Verminderung der T-Lymphozyten-abhängigen zellulären Immunität und die intrazelluläre mikrobielle Abtötung durch polymorphkernige Leukozyten (Abb. 1) [2].

Eisen und bakterielle Infektionen

Bakterien brauchen für eine schnelle Reproduktion Zugang zu den Eisenreserven des Wirts, sei es aus

Transferrin im Blut, aus Hämoglobin in Erythrozyten oder aus Ferritin in Makrophagen. Für den Menschen relevante Krankheitserreger haben dazu eine Vielzahl von raffinierten Mechanismen entwickelt [3].

Im Gegenzug hat die angeborene Immunabwehr ihrerseits Mittel gefunden, Bakterien den Zugang zu Eisen zu erschweren. Im Kreislauf bewirkt dies das Hormon Hepcidin, welches in der Leber gebildet wird, wenn die Eisenspeicher im Körper gefüllt sind. Hepcidin drosselt die Zufuhr von Nahrungseisen aus dem Darm und die Freisetzung von Eisen aus dem Abbau von alten Erythrozyten in Makrophagen. Bei Infektionen wird mittels freigesetzter Entzündungsmediatoren wie Interleukin-6 (IL-6) die Hepcidin-synthese stark stimuliert, was das Serumisen absinken lässt und so extrazellulären Bakterien den Zugang zu Eisen aus dem Blut erschwert (Abb. 1). Das häufigste und bekannteste Beispiel ist die Ausbildung einer Anämie bei Entzündung (früher Anämie bei chronischer Erkrankung, ACD) [4]. Die ACD gilt nach der Eisenmangelanämie als zweithäufigste Anämie weltweit und entwickelt sich oft bei stationären Patienten mit chronisch entzündlichen Erkrankungen, Krebs oder chronischen Infektionen. Dabei wirken Entzündungsmediatoren auf das Monozyten-Phagozyten-System ein und führen zu einer Eisenretention in Makrophagen, Hemmung der Epo-Synthese und der Reifung und Differenzierung von erythroiden Vorläuferzellen im Knochenmark. Das Serumisen fällt ab, Ferritin als Fast-response-Protein steigt an.

Hyphosphatämie durch III. Gen Eisenpräparate ist aus meiner Sicht kein klinisches Problem

Journal of Clinical Anesthesia 101 (2025) 111727

Contents lists available at ScienceDirect
Journal of Clinical Anesthesia
journal homepage: www.elsevier.com/locate/jclinane

Original Contribution

Ferric carboxymaltose with or without phosphate substitution in iron deficiency or iron deficiency anemia before elective surgery – The DeFICIT trial

Alexander Kaserer, M.D.^{a,*}, Julia Braun, Ph.D.^b, Alexander Mair, M.D.^a, Samira Akbas, M.D.^a, Julian Rössler, M.D.^a, Heike A. Bischoff-Ferrari, Prof.^{c,d}, Matthias Turina, Prof.^e, Pierre-Alain Clavien, Prof.^{e,f}, Isabelle Opitz, Prof.^g, Andreas Hülsmeier, D.Sc.^h, Gergely Karsai, D.Sc.^h, Greta Gascauskaitė, M.D.ⁱ, Gabriela H. Spahn, M.D.^h, Martin Schläpfer, Prof.^{a,i}, Donat R. Spahn, Prof.^a

^a Institute of Anesthesiology, University of Zurich and University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland

^b Departments of Epidemiology and Biostatistics, Epidemiology, Biostatistics and Prevention Institute, University of Zurich, Zurich, Switzerland

^c Department of Geriatrics and Aging Research, University of Zurich and University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland

^d Centre on Aging and Mobility, University of Zurich, Zurich, Switzerland

^e Department of Surgery and Transplantation, University of Zurich and University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland

^f Wyss Zurich Translational Center, ETH Zurich and Swiss Medical Network and Faculty of Medicine, University of Zurich, Zurich, Switzerland

^g Department of Thoracic Surgery, University of Zurich and University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland

^h Institute of Clinical Chemistry, University of Zurich and University Hospital Zurich, Zurich, Switzerland

ⁱ Institute of Physiology, University of Zurich, Zurich, Switzerland

HIGHLIGHTS

- Ferric carboxymaltose may induce fibroblast growth factor 23 mediated hypophosphatemia.
- We evaluated the effect of oral phosphate supplementation on mitigating hypophosphatemia caused by ferric carboxymaltose.
- Oral phosphate supplementation cannot prevent hypophosphatemia but, hypophosphatemia occurs in fewer patients.

A. Kaserer et al.

Journal of Clinical Anesthesia 101 (2025) 111727

Fig. 2. Boxplots of serum phosphate for the two groups at each time point.

18 mmol tägliche Dosis einer Phosphatergänzung vs. Placebo

UNSER FALL (II) DIAGNOSE:

MIKROZYTÄRE HYPOCHROME ANÄMIE

URSACHE:

**ANÄMIE DER CHRONISCHEN ERKRANKUNG
ODER CHRON. BLUTUNG**

WEITERES VORGEHEN:

**INFUSION VON 500 MG EISENCARBOXYMALTOSE
AUFSCHUB DER OP SIGMA RESEKTION UM 21 TAGE**

Polytrauma: Eisencarboxymaltose bei einem 17 jährigen Jungen mit Polytrauma

12.3 g/dl to 4.6 g/dl

48 h post i.v. ferinject 6 g/dl
8 Tage später 8,4 g/dl

Keine Transfusion
Keine Immunisierung
Keine Infektion

=> Keine Komplikation

Notfall OP

31 Jahre, weiblich, postpartale Blutung bei Uterus bicornis

Bild: <http://www.babycenter.de/a8472/anomalien-des-uterus-in-der-schwangerschaft>

22.10.2013, 07:45 Uhr
Hb 11,4 g/dl, vor der Geburt

22.10.2013, 22:45 Uhr
Hb 6,3 g/dl, Indikation zur
Notfall – Kürettage

Eisencarboxymaltose 500 mg postoperativ

26.10.2013
Hb 7,5 g/dl, Entlassung der Patientin

=> keine Komplikationen

Bei jungen, gesunden Patienten nach i.v. Eisensubstitution
nach 48 h ca. 0,38 g/dl Hb pro Tag

RET- H_e ist geeignet zur Diagnostik, Überwachung und Überwachung des Ansprechens der Therapie nach iv Eisengabe & Erythropoetingabe

	Day 0			Day 3			Day 9			
RBC	4.94	10 ⁶ /uL		RBC	4.91	10 ⁶ /uL		RBC	5.73	10 ⁶ /uL
HGB	7.1	g/dL		HGB	7.4	g/dL		HGB	9.2	g/dL
HCT	26.8	%		HCT	27.4	%		HCT	35.1	%
MCV	54.3	fL		MCV	55.8	fL		MCV	61.3	fL
MCH	14.4	pg		MCH	15.1	pg		MCH	16.1	pg
MCHC	26.5	g/dL		MCHC	27.0	g/dL		MCHC	26.2	g/dL
RDW-SD	43.6	fL		RDW-SD	43.4	fL		RDW-SD	44.5	fL
PLT &	574	10 ³ /uL		PLT &	514	10 ³ /uL		PLT &	369	10 ³ /uL
MPV	-----	fL		MPV	-----	fL		MPV	-----	fL
P-LCR	-----	%		P-LCR	-----	%		P-LCR	-----	%
RET#	0.0593	10 ⁶ /uL		RET#	0.1286	10 ⁶ /uL		RET#	0.1329	10 ⁶ /uL
RET%	1.20	%		RET%	2.62	%		RET%	2.32	%
IRF	11.2	%		IRF	39.0	%		IRF	22.5	%
RET-He	16.1	pg		RET-He	27.4	pg		RET-He	29.5	pg
D-He	1.8	pg		D-He	11.3	pg		D-He	13.7	pg
RPI	0.4			RPI	0.9			RPI	1.3	
% Hypo	74	%		% Hypo	77	%		% Hypo	60	%
Ferritin	91	ng/mL		Ferritin	41	ng/mL		Ferritin	39	ng/mL
S-TfR	2,72	mg/L		S-TfR	2,32	mg/L		S-TfR	1,70	mg/L
CRP	38	mg/L		CRP	18	mg/L		CRP	9	mg/L

UNSER FALL (III) OP:

22. TAGE NACH ERSTKONTAKT/ OP

Hb 11,3 /dl (+3g), Hk 37,8 %, MCH 24 pg, Ret He 33,5 pg

INTRAOPERATIV: WÄRMEMANAGEMENT, PH KONTROLLE, VERMEIDUNG VON HYPOKALZÄMIE, TRANEXAMSÄURE, KONTROLLIERTE HYPOTENSION, THORAKALER PDA

POSTOP. NACH OFFENER SIGMARESEKTION MIT TRANSANALER ANASTOMOSE, SUBSEGMENTRESEKTION DER LEBERMETASTASEN LINKS, PERIOPERATIV KEINE TRANSFUSION

Hb 10,4 /dl (-0,9g), Hk 34,0 %, MCH 24 pg, Ret He 33,6 pg

WEITERES VORGEHEN:

INFUSION VON 500 MG EISENCARBOXYMALTOSE
AUFSCHUB DER HEMIHEPATEKTOMIE (RE) UM 28 TAGE
ENTLASSUNG AUS DEM KH AM 5. TAG POSTOPERATIV

UNSER FALL (IV): 2. OP

42. TAGE NACH ERSTKONTAKT/ OP HEMIHEPARTEKTOMIE

Hb 13,6 /dl (+3g), Hk 41,8 %, MCH 26,8 pg, Ret He 33,6 pg

POSTOP. NACH HEMIHEPARTEKTOMIE RECHTS

Hb 10,3 /dl (-3,3g), Hk 28,4 %, MCH 27,5 pg, Ret He 33,6 pg

R0 Resektion - Entlassung – Port Anlage und Chemotherapie

PRAKTISCHE UMSETZUNG VON RET-HE (RETIKULOZYTEN-HÄMOGLOBIN-ÄQUIVALENT) IM PATIENT BLOOD MANAGEMENT (PBM):

STRATEGIEN UND ERFAHRUNGEN

REFERENT*INNEN: C. HÖNEMANN, VECHTA

INHALTSVERZEICHNIS

1. PRÄOPERATIV

2. DIAGNOSTIK

3. POSTOPERATIV

PRÄOPERATIVE ANÄMIE: BEURTEILUNG ZUR THERAPIE

***RPI - Retikulozyten Reproduktions-Index**

Bei Gesunden: RPI: 1-2

RPI bei Anämie:

> 2 → effektive Regeneration

> 3 → hyperregenerativer Erythropoese

< 2 → hypoplastische / ineffektiver Erythropoese

PRAKTISCHE UMSETZUNG VON RET-HE (RETIKULOZYTEN-HÄMOGLOBIN-ÄQUIVALENT) IM PATIENT BLOOD MANAGEMENT (PBM):

STRATEGIEN UND ERFAHRUNGEN

REFERENT*INNEN: C. HÖNEMANN, VECHTA

INHALTSVERZEICHNIS

1. PRÄOPERATIV

2. DIAGNOSTIK

3. POSTOPERATIV

ANÄMIE PROSTOPERATIV

WAS IST DIE MÖGLICHE URSACHEN

Gesteigerter Abbau

- Z.B. Autoimmunhämolytische Anämie
- Membrandefekte
- Herzklappen
- Malaria

"Dieses Foto" von Unbekannter Autor ist lizenziert gemäß [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Blutverlust

- **Akut** (z.B. OP; Unfälle)
- **Chronisch** (z.B. Gastrointest. Erkrankungen, Tumoerkrankungen)

Beeinträchtigte Erythropoese

- **Mineralstoffmangel**
(z.B. Vit. B 12 Mangel, Folsäuremangel Eisenmangel)
- **Toxisch** (z.B. Medikamente, Alkoholabusus)
- **Hereditär** (z.B. PNH, EPP)
- **Verdrängung** (z.B. maligne KM-Erkrankungen)

WAS IST PERIOPERATIVES PATIENT BLOOD MANAGEMENT?

PBM IST EIN INTERDISZIPLINÄRER UND MULTIMODALER UND SEKTORENÜBERGREIFENDER ANSATZ

PBM BEZIEHT IN DER PRÄ-, INTRA- UND POSTOPERATIVEN PHASE VERSCHIEDENE BEREICHE UND MEDIZINISCHE DISZIPLINEN EIN

PRÄOPERATIVE ANÄMIE: LEITLINIEN DER NATA BEI ELEKTIVEN ORTHOPÄDISCHEN EINGRIFFEN

ALGORITHMUS ZU NACHWEIS, BEWERTUNG UND MANAGEMENT EINER PRÄOPERATIVEN ANÄMIE¹

Mod. nach Goodnough LT et al. 2011.

1. Goodnough LT et al. Brit J Anaesth 2011; 106 (1): 13–22.

HERAUSFORDERUNG POSTOPERATIV

Akute Phase Reaktionen

Auslöser: (chron.) inflammatorische/maligne Erkrankungen, Systemerkrankungen, Infektionen etc.

Hauptsächliche Effektoren: Immunmodulatoren (IL-1/IL-6/IL-10/TNF- α / IFN- γ) und Hepsidinsynthese

Retention des Eisens in das retikulohistiozytäre System (Dysregulation)

später **Anämie chronischer Erkrankungen (ACD)** – Hospital Acquired Anemia

→ Einschränkung der Hämoglobinsynthese der Retikulozyten

Pathogenese der ACD

DIAGNOSTIK EISENSTOFFWECHSEL

Konzentration freies Eisen

Fluktuierend: Nahrungsaufnahme, zirkadiane Rhythmen
erniedrigt: Infektionen

Serum-Eisen

Serum-Ferritin

Speicherung von Eisen im RES

erniedrigt: Eisen-, Transferrinmangel, Hypothyreose
erhöht: Verwertungs-/Verteilungsstörung, Infekt, Lebererkrankungen, Ca, Bluttransfusion

Transportprotein des Eisens

erhöht: Eisenmangel
erniedrigt: Entzündungsreaktion

Transferrin

Transferrin-sättigung

Sättigung des Transferrins mit Eisen

erhöht: Hämochromatosen
erniedrigt: Eisenmangel, Verteilungsstörung

Löslicher Transferrin-Rezeptor

Eisenbedarf der Erythropoese

erhöht: Eisenbedarf
normal: chronische Erkrankungen
erniedrigt: Entzündungsreaktion

AKTUELLE LEITLINIENEMPFEHLUNGEN: DIAGNOSTIK

Modifizierter Leitfaden zur Anämiediagnostik:
 DGAI, AWMF. S3 Leitlinie: Präoperative Anämie Diagnostik und Therapie der Präoperativen Anämie, Leitlinie (Langversion). AWMF online; 2018

Parameter

Veränderung in Akut Phase Reaktion

Serumferritin
 [30-400 ng/ml]

↑↑

Transferrin
 [200-400 mg/dl]

normal bis ↓

Transferrinsättigung (TSAT)
 [16-45 %]

↓↓

löslicher Transferrinrezeptor (sTfR)
 [0,9-2,8 mg/l]

normal

sTfR/log Ferritin
 [methoden-abhängig]

normal

Hepcidin
 [methoden-abhängig]

↑↑

PARAMETER DER RETIKULOZYTENHÄMOGLOBINISIERUNG

I. RET-He [29,3 - 35,4 pg] [8]

- Hämoglobinisierungsgrad der Retikulozyten
- Surrogatparameter für zur Erythropoese zur Verfügung stehendes Eisen ($\neq$ Eisenspeicherfüllung)

II. Delta-He [1,2 - 3,6 pg] [8]

- rechnerische Differenz des Hämoglobinisierungsgrades der Retikulozyten vs. Erythrozyten

Messverfahren: Fluoreszenz-Durchflusssyztometrie
© all rights reserved, mit freundlicher Genehmigung der Fa. SYSMEX

Article

Improved diagnosis of iron deficiency anemia in the critically ill via fluorescence flowcytometric hemoglobin biomarkers

Mascha Zuther ¹, Marie-Luise Rübsam ², Mathias Zimmermann ³, Alexander Zarbock ¹ and Christian Hönemann ^{4,*}

¹ Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

² Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin, Universitätsmedizin Greifswald

³ Institut für Labormedizin Köpenick, DRK Kliniken Berlin

⁴ Abteilung für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin, St. Marienhospital Vechta & Klinik für Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

* Correspondence: c.honemann@icloud.com; Tel.+49 (0) 15208961106

Citation: Zuther, M.; Rübsam, M.-L.; Zimmermann, M.; Zarbock, A.; Hönemann, C. Fluorescence Flowcytometry-based blood count parameters enable rapid monitoring of iron deficient anemia and infection in intensive care unit patients. *Cells* **2022**, *11*, x. <https://doi.org/10.3390/xxxxx>

Academic Editor(s):

Received: date

Accepted: date

Abstract: Background: Iron deficiency anemia (IDA) is common in critically ill patients treated in the intensive care unit (ICU) yet leading to severe consequences. Precise and immediate diagnostics are **not available but** inevitable to administer adequate therapy. Serological parameters like serum ferritin and transferrin saturation (TSAT) are heavily influenced by simultaneous inflammation reactions, resulting in the need for more suitable parameters. Reticulocyte biomarkers like reticulocyte hemoglobin content (RET-He) and Delta-hemoglobin equivalent (Delta-He) determined by fluorescence flowcytometry **are more specific for the diagnosis of IDA-based anemia** and should be investigated for this purpose. Methods: **In a prospective cohort single center study**, serum ferritin and transferrin saturation (TSAT) were collected and compared to **RET-He and Delta-He by receiver operating curve (ROC) analysis. Sensitivity and specificity of a single variable or the combination of two variables as well as cut off-values for the diagnosis of IDA were calculated. Group comparison for IDA patients without IDA were assigned to a control group.** Results: Enrolled were 314 patients from an interdisciplinary ICU. RET-He (Area under curve (AUC) 0.847) and Delta-He (AUC 0.807) did indicate iron deficient anemia more specific and sensitive in comparison to serum ferritin (AUC 0.678) and TSAT (AUC 0.754). The detection of functional iron deficiency (FID) **occurred in 28.3% of cases with anemia.** Conclusions: **Determination of RET-He and Delta-He allows an increased precision and sensitivity of iron deficient anemia in the ICU.**

Keywords: reticulocyte parameters; anemia; iron deficiency; functional iron deficiency; reticulocyte hemoglobin content (RET-He); intensive care

Blutentnahme
Bestimmung des Blutbildes
Bestimmung der Retikulozytenparameter

III. Generations Eisen i.v.

Erythropoetin

Patient Blood Management in der Intensivmedizin

Patrick Meybohm
Suma Choorapoikayil
Kai Zacharowski

VNR: 2760512017152372241
DOI: 10.1055/s-0043-110651
Intensivmedizin up2date 2017; 13 (3): 291–307
ISSN 1614-4856
© 2017 Georg Thieme Verlag KG

Standardisiertes Gerinnungsmanagement bei Blutungen

bleeding Card Therapie-Optionen bei Blutung

© 2023 Dr. med. Claus Steuernagel V. Jun23

Behandlung von Hypothermie Azidose Hypocalcämie
 Körpertemperatur < 34 °C, pH < 7,2 und [Ca²⁺]_{ion} < 1 mmol/l haben einen hemmenden Einfluss auf die Hämostase. Basis-Labortests erfolgen bei 37° C mit Calcium-Zufuhr !!

Erythrozyten-Konzentrate EK
 Erythrozyten setzen den Thrombozyten-Aktivator ADP frei und bringen Thrombozyten in Gefäßwandnähe. Ein Hämatokrit unter 20% gilt hämostaseologisch als kritisch.

Tranexamsäure Cyklokapron®
 Schützt einen Thrombus vor Lyse und verbessert die Thrombozyten-Funktion. Dosis: 1. Bolus 10-30 mg/kg KG (1-2g) 2. danach ggf. Perfusion 1-2 mg/kg KG/h.

DDAVP = Desmopressin Minirin®
 Aktiviert Thrombozyten (unspezifisch) und setzt von-Willebrandfaktor aus Endothel frei. Indikation: Thrombozyten-Aggregationsstörung (z.B. ASS, von-Willebrand-Syndrom). Dosis: 0,3 µg/kg über 30 Minuten (ggf. nach 12 h bzw. postop. wiederholen).

Protamin
 Antidot gegen unfraktioniertes Heparin. Dosis abhängig von applizierter Heparin-Dosis.

Fibrinogen Haemocomplettan® P
 Ligand für die Thrombozyten-Aggregation & Substrat für die Fibrinbildung. Dosis: 3-6 g.

Fresh Frozen Plasma FFP Q-Plasma
 Enthält (fast) alle pro- und antikoagulatorisch wirkenden Faktoren. Dos.: 15-20 ml/kg KG.

Thrombozyten-Konzentrate TK
 Indikation: 1. Thrombozytopenie < 50-100.000 /µl bei (lebensbedrohlicher) Blutung. 2. Schwere Thrombozytenfunktionsstörung.

PSSB z.B. Beriplex® P/N
 Faktoren-Konzentrat (FII, FVII, FIX, FX). Indikation: Antagonisierung von Coumadin (Warfarin®), Acenocoumarol (Sintrom®) und Phenprocoumon (Marcumar® / Falithrom®).

rFVIIa Novoseven®
 Aktiviert durch starke Initialisierungsreaktion die sekundäre Hämostase (Thrombin) und konsekutiv auch die Thrombozyten. Dosis: 90 µg/kg KG-Bolus, ggf. nach 3h wiederholen.

Faktor XIII Fibrogammin®
 Faktor XIII vernetzt Fibrinmoleküle zu einem stabilen Thrombus. Anmerkung: Ein FXIII-Mangel ist in den Routine-Gerinnungstests nicht erkennbar. Dosis: 1.250-2.500 E.

Idarucizumab Praxbind®
 Antidot gegen Pradaxa® (Dabigatran). Dosierung: 1x 5g als Kurzinfusion (ggf. wdh).

Andexanet alfa Ondexxya® Antidot gegen Apixaban oder Rivaroxaban. Dosierung: NIEDRIG: 400mg/15min ▶ 480 mg/2h HOCH: 800 mg/30min ▶ 960 mg/2h

von-Willebrand-Faktor-FVIII-Präparat Haemate® P
 Faktor-VIII-Präparat, das vW-Faktor-Aktivität enthält. Indikation: vW-Syndrom Typ 2b. Dosis an vW-Faktor: ca. 40-80 IE/kg KG.

Die Karte zeigt eine Auswahl an Blutprodukten für Erwachsene.
 Die o.g. Blutprodukte sollen von erfahrenen Ärzten eingesetzt werden.
 Dosierungen sind orientierend ▶ Individuelle Anpassung erforderlich.
Hämophilie-Patienten sind auf der Bleeding Card nicht berücksichtigt.

= Link zu Literatur im Internet BÄK-Leitlinie

bleeding Card Basislabor bei Blutung

© 2022 Dr. med. Claus Steuernagel

	Quick	aPTT	Thrombozyten-anzahl	Differenzialdiagnose (relevante Auswahl)	TZ Thrombin-Zeit
1.	✓	✓	✓	☐ Thrombozyten-Funktionsstörung: ASS, Clopidogrel et al., GP IIb/IIIa-Rez.-Antagonisten, Bernard-Soulier-Syndrom, Glanzmann-Thrombasthenie, Storage-Pool-Disease ☐ von-Willebrand-Syndrom (leichte Form) ☐ Hypothermie ☐ Azidose ☐ Hypocalcämie ☐ Faktor-XIII-Mangel ☐ Überdosierung mit niedermolekularem Heparin	☐ ☒
2.	↓	✓	✓	☐ Phenprocoumon (z.B. Marcumar®) ☐ Xa-Inhibitor-Therapie ☐ Leberzellschaden ☐ Argatroban-Therapie ☐ Vitamin-K-Mangel ☐ Faktor-VII-Mangel (angeboren/erworben)	☐ ☒
3.	✓	↑	✓	☐ Heparin-Therapie ☐ Dabigatran ☐ Argatroban-Therapie ☐ Überdosierung mit niedermolekularem Heparin ☐ Fibrinogen-Mangel ☐ Hämophilie A oder B ☐ Hermkörper-Hämophilie ☐ Xa-Inhibitor-Therapie ☐ von-Willebrand-Syndrom	☐ ☒
4.	↓	↑	✓	☐ Heparin-Therapie (hochdosiert) ☐ Fibrinogen-Mangel ☐ Hyperfibrinolyse ☐ Fibrinolytische Therapie ☐ Leberfunktionsstörung	☐ ☒
5.	✓	✓	↓	☐ HIT-II Heparin-Induzierte Thrombozytopenie Typ II ☐ HELLP-Syndrom ☐ Storage Pool Disease ☐ von-Willebrand-Syndrom Typ 2b ☐ beginnende DIC (Verbrauchskoagulopathie) ☐ ITP ☐ idopathisch-Thrombozytopenische Purpura ☐ TTP ☐ Thrombotisch-Thrombozytopenische Purpura ☐ HUS ☐ Hämolytisch-Ürämisches Syndrom ☐ Bernard-Soulier-Syndrom	☐ ☒
6.	✓	↑	↓	☐ von-Willebrand-Syndrom Typ 2b ☐ DIC (Verbrauchskoagulopathie) ☐ Verdünnungs-koagulopathie ☐ HIT-II unter Heparin-Therapie	☐ ☒
7.	↓	↑	↓	☐ Verbrauchs-koagulopathie ohne sekundäre Fibrinolyse ☐ Verdünnungs-koagulopathie ☐ Schwere Leberfunktionsstörung ☐ Verbrauchs-koagulopathie mit sekundärer Fibrinolyse ☐ HIT-II unter Heparin-Therapie	☐ ☒

Legende: ✓ = Normalwert ↑ = Zeit verlängert ↓ = Wert erniedrigt

Die Differenzialdiagnose des Labors ist eine relevante Auswahl !
 Den kombinierten Konstellationen (4./6./7.) kann auch die Kombination von Einzelstörungen aus 2., 3. und/oder 5. zugrunde liegen.
 Die Differenzialdiagnose 1. ist zusätzlich bei allen Störungen zu prüfen.
 Haben Sie auch eine "chirurgische Blutung" in Betracht gezogen?

bleedingcard.de Online-Version Bleeding Card

Standardisiertes Gerinnungsmanagement bei PERIPARTALEN Blutungen

emergency card *peripartal*
© 2022 Dr. med. Claus Steuernagel

Peripartale Blutung Uterus-Atonie

SCHNELL

Syntocinon® **Therapie-Optionen**
(Auswahl)

Cyklokapron® **Oxytocin** (Syntocinon®) zur Tonisierung des Uterus. Initialdosis 3-5 IE, danach 10-40 IE per infusionem. Cave Blutdruckabfall. Cave Kammerflimmern bei gleichzeitiger Gabe mit Nalador® (Sulproston)!

Haemocomplettan® **Tranexamsäure** (Cyklokapron®) bei vermuteter oder nachgewiesener Fibrinolyse (Rotem®, Thrombinzeit). Dosierung: 2 g iv., ggf. Wiederholung nach 6-8 h.

Nalador® **Fibrinogen-Konzentrat**. Indikation: Blutung durch Fibrinogen-Mangel, Faktoren-Verbrauch, Verdünnungskoagulopathie oder Fibrinolyse. Dosis 2-6 g. Ziel: Fibrinogenkonzentration > 1,5-2 g/l.

Erythrozyten-Konzentrate **Sulproston** (Nalador®) zur Tonisierung des Uterus. 500µg /500ml NaCl 0,9% (max. Tagesdosis 1.500µg). Initial- und Erhaltungsdosis: 1,7 ml/min = 100 ml/h. Maximalgeschwindigkeit: 8,3 ml/min = 500 ml/h.

Lokale Maßnahmen Anzustreben ist ein Hb-Wert von 7-8 g/dl bei einer ansonsten gesunden Patientin. Bei lebensbedrohlicher Blutung gilt ein Hämatokrit von 30% bzw. ein Hb-Wert von 10,0 g/dl als Zielwert.

Life Support Uterus-Cavum-Tamponade mit Ballonkatheter oder Celox®. Gefäßligaturen, Kompressionsnähte, Packing, Embolisierung. Ultima Ratio: Hysterektomie (ggf. bimanuelle Aortenkompression bis zu 20 Min.)

Weitere Optionen: **PPSB** - Fresh Frozen Plasma - Thrombozyten-Konzentrate

☞ Handlungsalgorithmus der PPH-Konsensus-Gruppe

☞ Leitlinie D-A-CH - Ges. Gynäkologie und Geburtshilfe

☞ = [Link](#) ins Internet ☞ [gerinnung.online](#)

emergency card *peripartal*
© 2022 Dr. med. Claus Steuernagel

Peripartale Blutung Uterus-Atonie

Verdünnungskoagulopathie ☞

Typischer Verlauf:
Bei einer Verdünnungskoagulopathie wird zunächst die sekundäre Hämostase pathologisch (**aPTT, Quick-Wert**), später fällt die **Thrombozytenzahl** ab. Beim **Clot Observation Test** bleibt eine Gerinnselbildung im Röhrchen auch nach 8-10 Minuten noch aus.

Therapie-Optionen: **Fibrinogen** (z.B. Haemocomplettan® P): 2-6 g.
PPSB (z.B. Beriplex®) ca. 25 IE/kg KG.
FFP (ca. 20 ml/kg KG)
Thrombozytenkonzentrate bei Thrombozytenzahl < 50.000/µl.
Erythrozytenkonzentrate (Ziel-Hb: 7-8 g/dl).

Hemmkörperhämophilie ☞

Typische Konstellation:
Starke Blutung (sneigung) und eine bereits bei Aufnahme der Schwangeren ins Krankenhaus **stark verlängerte aPTT** (Antikörper gegen Faktor VIII). Quick-Wert und Thrombozytenzahl liegen initial im Normbereich.

Therapie-Optionen: **rFVIIa** (Novoseven®) ist bei dieser Diagnose Mittel der Wahl. Dosierung: 90 µg/kg KG, Nachinjektionen nach 2-3 Stunden. Je nach Blutverlust und Laboregebnissen zusätzlich **Fibrinogen** (z.B. Haemocomplettan® P), **PPSB** (z.B. Beriplex®), **Thrombozyten-Konzentrate** und **Erythrozyten-Konzentrate**.

Hyperfibrinolyse ☞

Typische Konstellation: Anhaltende Blutung oder nur kurz anhaltende Blutstillung trotz Gabe großer Mengen an pro-koagulatorischen Blutprodukten. Labortests: Typisches Bild in der **Rotem®-Diagnostik** und relevante Verlängerung der **Thrombinzeit** (**Thrombinzeit**-Verlängerung auch bei **Fibrinogen-Mangel**). Im **Clot Observation Test** löst sich ein Gerinnsel im Serum-Röhrchen nach 30-60 Minuten wieder auf.

Therapie-Optionen: **Tranexamsäure** (Cyklokapron®): 2 g als Bolus iv., ggf. nach 6-8 h wiederholen. Je nach Blutverlust und Laboregebnissen: **Fibrinogen** (z.B. Haemocomplettan®), **PPSB** (z.B. Beriplex®), **Thrombozyten-Konzentrate** und **Erythrozyten-Konzentrate**.

☞ = [Link](#) ins Internet

© 2022 Dr. med. Claus Steuernagel

Gerinnungsmanagement bei PLÄTTCHENFEHLFUNKTION

pH, Kalziumsubstitution und Temperaturmanagement

- Azidose Ausgleich
- Temperaturmanagement
- Kalziumhaushalt (ionisiertes Kalzium)

Unterschied zwischen
Kalziumglukonat (3-5 Amp.)
Kalziumchlorid (1-2 Amp.)
Ziel Ca > 1,2 mmol/l

- Anämietoleranz

Fig. 3

Total drawn blood volume during intensive care stay. Mean values with 95% confidence intervals are shown for standard-volume tubes (standard VT), small-volume tubes (small VT) and small-volume tubes + blood conservation devices (small VT + BCD).

BCD = blood collection device; VT = volume tubes

Weniger Blutentnahmen

Can J Anesth/J Can Anesth (2024) 71:213-223
<https://doi.org/10.1007/s12630-023-02643-8>

REPORTS OF ORIGINAL INVESTIGATIONS

Effect of using smaller blood volume tubes and closed blood collection devices on total blood loss in patients undergoing major cardiac and vascular surgery

Effet de l'utilisation de tubes de volume sanguin plus petits et de dispositifs de prélèvement sanguin fermés sur la perte de sang totale chez la patientèle de chirurgie cardiaque et vasculaire majeure

Vanessa Neef, MD · Chantal Himmele · Florian Piekarski, MD · Lea V. Blum, MD · Lotta Hof, MSc · Wojciech Derwich, MD · Tomas Holubec, MD · Patrick Meybohm, MD · Suma Choorapoikayil, PhD

Blutentnahmen bis zu mehr als 1500 ml

Fig. 1

Number and volume of blood analysis per collection tube. The bubble plot shows for each collection tube the number and drawn blood volume per day. Bubble size represents the number of performed blood analyses.

ABG = arterial blood gas; EDTA = ethylenediaminetetraacetic acid; LOS = length of hospital stay; SCC = sodium citrate coagulation

REPORTS OF ORIGINAL INVESTIGATIONS

Effect of using smaller blood volume tubes and closed blood collection devices on total blood loss in patients undergoing major cardiac and vascular surgery

Effet de l'utilisation de tubes de volume sanguin plus petits et de dispositifs de prélèvement sanguin fermés sur la perte de sang totale chez la patientèle de chirurgie cardiaque et vasculaire majeure

Vanessa Neef, MD · Chantal Himmele · Florian Piekarski, MD · Lea V. Blum, MD · Lotta Hof, MSc · Wojciech Derwich, MD · Tomas Holubec, MD · Patrick Meybohm, MD · Suma Choorapoikayil, PhD

POC Methoden reduzieren den iatrogenen Blutverlust

Patient Management .de

Vergleich von offenen vs. geschlossenen invasiven Druckaufnehmersystemen im Rahmen des Patient Blood Management

Eine Übersichtsarbeit zu Technik, Outcome, Patientensicherheit und zur Wirtschaftlichkeit

Comparison of open and closed, invasive pressure monitoring devices in Patient Blood Management – review of engineering, outcome, patient safety and economic viability

S. Westphal¹ · K. Zacharowski¹ · A. Kudraschow² · C. Kempf¹ · P. Meybohm¹

Schematische Darstellung eines geschlossenen Druckaufnehmersystems.
Distales patientenfernes Reservoir für die Blutaspiration mit patientennah vorgeschaltetem Blutentnahmeport. Spülung erfolgt über Entleerung des Reservoirs mit anschließender interner Spülung.

POSTPERATIVE ANÄMIE: BEURTEILUNG UND THERAPIE

***RPI - Retikulozyten Reproduktions-Index**

Bei Gesunden: RPI: 1-2

RPI bei Anämie:

> 2 → effektive Regeneration

> 3 → hyperregenerativer Erythropoese

< 2 → hypoplastische / ineffektiver Erythropoese

Restriktive Indikation zur Transfusion auf der ICU

► **Tab. 4** Querschnitts-Leitlinie der Bundesärztekammer [29] (modifiziert)

Hb-Wert	Transfusion	Bemerkung
≤ 6 g/dl (≤ 3,7 mmol/l)	ja	Im Einzelfall können bei adäquater Kompensation und ohne Risikofaktoren auch niedrigere Hb-Werte ohne Transfusion toleriert werden.
> 6–8 g/dl (3,7–5 mmol/l)	ja	<p>bei eingeschränkter Kompensation und vorhandenen Risikofaktoren, z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ koronare Herzkrankheit ▪ Herzinsuffizienz ▪ zerebrovaskuläre Erkrankungen <p>Hinweise auf anämische Hypoxie (= physiologische Transfusionstrigger): z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tachykardie ▪ Hypotension ▪ ischämietypische EKG-Veränderungen (ST-Streckenveränderungen) ▪ Laktatazidose (Laktat > 2 mmol/l + Azidose) ▪ Anstieg der globalen O₂-Extraktion > 50 % ▪ Abfall der gemischtvenösen O₂-Sättigung < 50 % ▪ Abfall der zentralvenösen O₂-Sättigung < 60 % ▪ neu auftretende Rhythmusstörungen oder regionale myokardiale Kontraktionsstörungen
	nein	bei adäquater Kompensation und nicht vorhandenen Risikofaktoren
8–10 g/dl (5–6,2 mmol/l)	ja/nein	ABER: sehr schwache Empfehlung mit unklarem Nutzen-Risiko-Verhältnis Hinweise auf anämische Hypoxie (physiologische Transfusionstrigger)
> 10 g/dl (≥ 6,2 mmol/l)	nein	Im Einzelfall kann eine Transfusion auf Hb-Werte > 10 g/dl indiziert sein.

WELCHES EISEN, ORAL/I.V.? EISENRESORPTION ORALER FE(II) PRÄPARATE

Präparat	Resorptionsrate ohne Inflammation
Fe (II), quick release	
Assofer	7,6 %
Eryfer	7,7 %
Spartocine	7,0 %
Fe (II), slow release	
Ferro sanol duodenal	6,6 %
Kendural C	4,5 %
Tardyferon	3,4 %
Fe (II)-Brausetabletten	
Lösferron	3,1 %

Inflammation

 signifikant reduzierte
 Resorptionsleistung des
 Darms

ALSO I.V. EISEN EIGENSCHAFTEN UNTERSCHIEDLICHER INTRAVENOSER EISENFORMULIERUNGEN

	Eisengluconat	Eisensucrose	Eisendextran (niedermolekular)	Eisen- carboxymaltos e
Molekulargewicht	< 50 kD	34-60 kD	165 kD	150 kD
Komplexstabilität	gering	mäßig	hoch	hoch
akute Toxizität	hoch	mittel	gering	gering
Maximaldosis	62,5 mg	500 mg	20 mg/kg KG	1.000 mg
minimale Infusionsdauer	30 min	210 min	360 min	15 min
maximale Einzeldosis bei Injektion	62,5 mg	200 mg	200 mg	1000 mg
maximale Injektionsdauer	10 min	10 min	2 min	Bolus
Testdosis erforderlich	nein	ja	ja	nein

Kosten + Nutzen

PRÄOPERATIVE ANÄMIE: BEURTEILUNG UND THERAPIE

***RPI - Retikulozyten Reproduktions-Index**

Bei Gesunden: RPI: 1-2

RPI bei Anämie:

> 2 → effektive Regeneration

> 3 → hyperregenerativer Erythropoese

< 2 → hypoplastische / ineffektiver Erythropoese

PRÄOPERATIVE ANÄMIE: BEURTEILUNG UND THERAPIE

***RPI - Retikulozyten Reproduktions-Index**

Bei Gesunden: RPI: 1-2

RPI bei Anämie:
> 2 → effektive Regeneration
> 3 → hyperregenerativer Erythropoese
< 2 → hypoplastische / ineffektiver Erythropoese

ESA als Anti-Anämika

Wolff M, Fandrey J, Hirner A & Jelkmann W.

“Perioperative use of recombinant human erythropoietin in patients refusing blood transfusions. Pathophysiological considerations based on 5 cases“

Eur J Haematol 58: 154-9, 1997

Vor 28 Jahren

ESA als Anti-Anämika

Minderung der Transfusionsbedürftigkeit (Meta-Analyse)

Zarychanski R et al. "Erythropoietin-receptor agonists in critically ill patients: a meta-analysis of randomized controlled trials". *Can Med Assoc J* 177: 725-34, 2007

Vor 18 Jahren

Study	No. of events / No. of participants		Odds ratio (95% CI)
	EPO	Control	
Gabriel et al ¹⁰	4/9	6/10	0.53 (0.09-3.12)
Corwin et al ¹	36/80	44/80	0.67 (0.36-1.25)
Corwin et al ⁸	328/650	394/652	0.67 (0.54-0.83)
Georgopolous et al ¹¹	32/100	28/48	0.34 (0.17-0.68)
Silver et al ¹³	13/42	26/44	0.31 (0.13-0.74)
Vincent et al ¹⁵	18/44	12/24	0.69 (0.25-1.90)
Corwin et al ⁹	337/733	352/727	0.91 (0.74-1.12)
<i>Overall</i>			0.73 (0.64-0.84)

CI = confidence interval

$p < 0.001$

"Analysis of transfusion independence among critically ill patients"

MÖGLICHES KLINISCHES VORGEHEN (RPI < 1) ZUR EISENSUBSTITUTION UND ERYTHROPOETIN AUF ICU

EMPFEHLUNG ZUR BEHANDLUNG MIT I.V. EISEN (III. Generation*) & Erythropoetin alpha s.c.

Folsäure und Vit B12 nicht vergessen

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

Prof. Dr. Christian Hönemann

St. Marienhospital Vechta
Abteilung für Anästhesie und operative Intensivmedizin

Apl. Professor Universitätsklinikum Münster

Marienstraße 6-8
49377 Vechta

christian.hoenemann@kh-vec.de

Arbeitsgruppenmitglieder

Dr med. ML Rübsam (Greidswald)
Prof. Dr. M. Zimmermann (Berlin)
Dr. med. M Zuther (Münster)
Cand. med. N. Nacke (Münster)
Cand. med. Bastian Blömer (Rostok)
M. Bokop (Vechta)
E. Rollie (Vechta)
Prof. Dr. C. Schewe (Rostok)
Prof. Dr. D. Fischer (Heidelberg)
Dr. rer nat St. Klatte (Bremen)
B. Behrens (Hamburg)
und viele andere mehr