

SIKO-Empfehlungen zur Impfung gegen Orthopoxviren

- 8. August 2022 -

Entscheidungsmatrix für Impfungen gegen Orthopoxviren

Art des Risikos	Risikokategorie	Vorgehen	Impfdosis 1	Impfdosis 2
Immunkompetente				
keine Pockenimpfung (Vaccinia-Virus naiv)				
direkter enger Kontakt*	RK 2b	empfehlen	X	X
soziales Umfeld	RK 3	Einzelfallentscheidung	X	X
unvollständige Pockenimpfung (eine Impfung ohne „take“)				
direkter enger Kontakt*	RK 2b	empfehlen	X	----
soziales Umfeld	RK 3	Einzelfallentscheidung	X	----
vollständige Pockenimpfung (eine Impfung mit „take“ oder ≥ 2 Impfungen)				
direkter enger Kontakt*	RK 3	nicht erforderlich	----	----
soziales Umfeld	RK 3	nicht erforderlich	----	----
Immunkompromittierte				
keine Pockenimpfung (Vaccinia-Virus naiv)				
direkter enger Kontakt*	RK 1	empfehlen	X	X
soziales Umfeld	RK 2a	empfehlen	X	X
unvollständige Pockenimpfung (eine Impfung ohne „take“)				
direkter enger Kontakt*	RK 1	empfehlen	X	X
soziales Umfeld	RK 2a	empfehlen	X	X
vollständige Pockenimpfung (eine Impfung mit „take“ oder ≥ 2 Impfungen)				
direkter enger Kontakt*	RK 2a	empfehlen	X	----
soziales Umfeld	RK 3	Einzelfallentscheidung	X	----

*zu erkrankten Personen ebenso wie zu erkrankten Tieren (z.B. Nager) als mögliche Indexfälle!

