



Neuropathischer diabetischer Fuß. Schwere lokale und allgemeine Infektion. Die Läsion ist durch einen unbehandelten onychomykös veränderten Nagel in die Weichteile eingebrochen und hat zu einer Infektausbreitung über die Extensorensehne geführt.

Ergänzung

Der Mitautor der publizierten Originalie „Einführung der ICD-10 ab 1. 1. 2000“, „Ärzteblatt Sachsen“, Heft 1/2000, Seite 25, Herr Dr. Lochmann, ist an der „**Westsächsischen** Hochschule Zwickau (FH), Fachbereich Wirtschaftswissenschaften“ tätig.

Korrektur

In der Originalie „Die Prophylaxe des diabetischen Fußes steht im Vordergrund“, „Ärzteblatt Sachsen“, Heft 1/2000, Autor: OA Dr. med. Hannes Rietzsch, wurde der Fuß der Abbildung 2 körperseitenverkehrt abgedruckt: Korrekte Darstellung



Gleicher Fuß nach etwa 6 Wochen Lokaltherapie (Nekrektomie, Abtragung der Nagelveränderung, Wundspülung, Verband und konsequente systemische Antibiose). Es ist die Stabilisierung des Befundes und besonders auch der Extensorensehne gelungen.